

褥瘡推定発生率

当院ご入院中に発生した患者さんの褥瘡（床ずれ）推定発生率です。

2022年4月	2022年5月	2022年6月	2022年7月	2022年8月	2022年9月
0.4%	0.4%	0.4%	0%	0.4%	0.4%

2022年10月	2022年11月	2022年12月	2023年1月	2023年2月	2023年3月
0.0%	0.3%	0.3%	0.3%	0.0%	0.0%

※全国一般病院 平均値
1.6%

定義

算出期間：2022年4月から2023年3月

(調査日に褥瘡を保有する患者数－入院時すでに褥瘡を保有していた患者数) / 調査日の当院入院患者数 × 100 (%)

注1 調査日の施設入院患者数：調査日に入院または入院予定者は含めない。

調査日に退院または退院予定者は含める。

注2 1名患者が褥瘡を複数部位有していても、患者数は1名として数える。

注3 入院時すでに褥瘡を保有していた患者であっても、新たに入院中に褥瘡が発生した場合は、院内褥瘡発生者として取り扱い、褥瘡推定発生率を算出する。

※表中の「全国一般病院平均値」は、

日本褥瘡学会 「第4回（平成28年度）日本褥瘡学会実態調査委員会報告1」より引用しています。