

F 泌尿器がん・胚細胞腫瘍

【共通確認事項】
 CDDP、CBDCAを含むレジメン：原則、アプレビタント使用

コード	レジメン名称	がん腫	申請科	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日	1コース期間	備考 委員会での協議事項等
F010001	尿路上皮GC(GEM: day1,8,15)	尿路上皮癌	泌尿器	GEM:ゲムシタピン CDDP:シスプラチン	1000mg/m ² 70mg/m ²	30分 2時間	d1・8・15 d2	4週毎	進行・再発(1st):PDまで
F010003	尿路上皮GC(GEM: day1,8)	尿路上皮癌	泌尿器	GEM:ゲムシタピン CDDP:シスプラチン	1000mg/m ² 70mg/m ²	30分 2時間	d1・8 d2	3週毎	4週ごとレジメンに忍容性がない患者に限ること
F010005	尿路上皮GEM+CBDCA	尿路上皮癌	泌尿器	GEM:ゲムシタピン CBDCA:カルボプラチン	1000mg/m ² AUC4.5 ※AUC4やAUC5も報告あり (備考参照)	30分 60分	d1・8 d1	3週毎	腎障害でCDDPが使用できない症例に限ること AUC4(Urology 64: 479-484, 2004)、 AUC4.5(J Clin Oncol 30:191-199,2011)やAUC5(Oncology 59: 24-27, 2000)など複数報告あり
F010007	尿路上皮ペムブロリズマブ単剤 (3週間毎)	尿路上皮癌	泌尿器	キイトルーダ	200mg/body	30分	d1	3週毎	2ndライン以降
F010008	尿路上皮ペムブロリズマブ単剤 (6週間毎)	尿路上皮癌	泌尿器	キイトルーダ	400mg/body	30分	d1	6週毎	初回導入から3か月以内は3週毎とする。
F010009	尿路上皮GP(GEM+PTX)	尿路上皮癌	泌尿器	GEM:ゲムシタピン PTX:パクリタキセル	2500mg/m ² 150mg/m ²	30分 3時間	d1 d1	2週毎	2ndライン以降
F010011	尿路上皮ゲムシタピン単剤	尿路上皮癌	泌尿器	GEM:ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分	d1・8・15	4週毎	
F010013	尿路上皮アベルマブ維持療法	尿路上皮癌	泌尿器	アベルマブ:バベンチオ	10mg/kg	1時間	d1	2週毎	プラチナ併用1次治療4~6サイクル後の維持療法
F010015	尿路上皮エンホルツマブ	尿路上皮癌	泌尿器	パドセブ	1.25mg/kg	30分	d1・8・15	4週毎	2ndライン以降
F010017	尿路上皮ニボルマブ (2週間毎)	尿路上皮癌	泌尿器	オブジーボ	240mg/body	30分	d1	2週毎	筋層浸潤性尿路上皮がん術後
F010019	尿路上皮ニボルマブ (4週間毎)	尿路上皮癌	泌尿器	オブジーボ	480mg/body	30分	d1	4週毎	筋層浸潤性尿路上皮がん術後 初回導入から3か月以内は2週毎とする。
F020001	腎ニボルマブ単剤 (2週毎)	腎臓癌	泌尿器	オブジーボ	240mg/body	30分	d1	2週毎	2ndライン以降
F020002	腎ニボルマブ単剤 (4週毎)	腎臓癌	泌尿器	オブジーボ	480mg/body	30分	d1	4週毎	初回導入から3か月以内は2週毎とする。
F020003	腎ニボルマブ+イピリムマブ(3週毎)	腎臓癌	泌尿器	オブジーボ ヤーボイ	240mg/body 1mg/kg	30分 30分	d1 d1	3週毎	1stライン 併用は4回まで、以降ニボルマブ単剤
F020005	腎ニボルマブ+カボザンチニブ(2週毎)	腎臓癌	泌尿器	オブジーボ カボメテイクス	240mg/body 40mg/day	30分 経口	d1 連日	2週毎	
F020010	腎ペムブロリズマブ+アキシチニブ (3週毎)	腎臓癌	泌尿器	Pembro:キイトルーダ AXT:インライタ	200mg/body 10mg/日	30分 経口	d1 連日	3週毎	1stライン
F020013	腎ペムブロリズマブ+レンパチニブ (3週間毎)	腎臓癌	泌尿器	Pembro:キイトルーダ レンピマ	200mg/body 20mg/day	30分 経口	d1 連日	3週毎	
F020015	腎ペムブロリズマブ術後(3週毎)	腎臓癌	泌尿器	Pembro:キイトルーダ	200mg/body	30分	d1	3週毎	術後補助化学療法 (術後の病理学的組織診断等により適応可否を判断すること) 投与期間は12か月間まで
F020017	腎アベルマブ+アキシチニブ(2週毎)	腎臓癌	泌尿器	アベルマブ:バベンチオ AXT:インライタ	10mg/kg 10mg/day	1時間 経口	d1 連日	2週毎	
F020019	腎テムシロリムス(1週毎)	腎臓癌	泌尿器	テムシロリムス:トリーセル	25mg/m ²	60→30分	d1	1週毎	
F030001	前立腺ドセタキセル	前立腺癌	泌尿器	DOC:ドセタキセル	70mg/m ²	60分	d1	3週毎	年齢等を考慮して適宜減量して開始する
F030003	前立腺カバジタキセル	前立腺癌	泌尿器	ジェブタナ	25mg/m ²	60分	d1	3週毎	原則、投与24~72時間後にジューラスト使用
F040001	精巣腫瘍BEP	精巣腫瘍	泌尿器	BLM:ブレオ VP-16:ベブシド CDDP:シスプラチン	30mg/body 100mg/m ² 20mg/m ²	30分 2-3時間 2-3時間	d1・8・15 d1-5 d1-5	3週毎	最大4コースまで 投与量・スケジュールは可能な限り変更しない(効果減弱)
★	VIP	精巣腫瘍	泌尿器	VP-16:ベブシド IFM:イホマイド CDDP:シスプラチン	75mg/m ² 1.2g/m ² 20mg/m ²	2時間 30分 4時間	d1-5 d1-5 d1-5	3週毎	
F040010	精巣腫瘍カルボプラチン単剤(AUC=7)	精巣腫瘍	泌尿器	CBDCA:カルボプラチン	AUC=7	60分	d1	3週毎	保険適応外だが日本のガイドラインに記載あり承認
★	精巣腫瘍TIP	精巣腫瘍	泌尿器	PTX:パクリタキセル IFM:イホマイド CDDP:シスプラチン	210mg/m ² 1.2g/m ² 20mg/m ²	3時間 4時間 30分	d1 d2-6 d2-6	3週毎	
★	MPB	陰茎癌	泌尿器	MTX:メソトレキセート ロイコボリン CDDP:シスプラチン BLM:ブレオ	200mg/m ² 25mg/回×4/日×3日 20mg/m ² 10mg/m ²	30分 内服 3時間 24時間	d1・15・22 d2-5、16-19、23-26 d2-6 d2-6	4週毎	
★	TIP(陰茎癌)	陰茎癌	泌尿器	PTX:パクリタキセル IFM:イホマイド CDDP:シスプラチン	175mg/m ² 1.2g/m ² 25mg/m ²	24時間 2時間 2時間	d1 d1-3 d1-3	3週毎	
★	陰茎癌FP療法	陰茎癌	泌尿器	5FU CDDP:シスプラチン	800mg/m ² 80mg/m ²	24時間 2時間	d1-5 d1	4週毎	
F060001	テラルピシン膀胱注入	膀胱癌	泌尿器	テラルピシン	30mg/body	膀胱内注入	d1	1週毎	