

大腸癌

※催吐リスク

最小：制吐剤なし、軽度：デキサート、中等度：デキサート+5-HT3受容体遮断薬、高度：デキサート+5-HT3受容体遮断薬+NK1拮抗薬±オランザピン

レジメン名	薬剤名	投与量	投与時間	投与日	1コース期間	催吐リスク	備考
大腸 Pmab：2週毎	Pmab：ペグティックス注射液	6 mg/kg	60分	Day1	3週毎	最小	
大腸 Cmaab：2週毎	Cmaab：アビタックス注射液	500 mg/㎡	初回：120分、2回目以降：60分	Day1	2週毎	最小	
大腸 Cmaab：毎週	Cmaab：アビタックス注射液	400 mg/㎡ →250 mg/㎡	初回：120分、2回目以降：60分	Day1	1週毎	最小	
大腸 mFOLFOX6(2週毎) + Cmaab (1週毎)	L-OHP：オキサリプラチン注射液 I-LV：レボレチン注 5-FU：フッピラジール注（急速） 5-FU：フッピラジール注（持続） Cmaab：アビタックス注射液	85 mg/㎡ 200 mg/㎡ 400 mg/㎡ 2400 mg/㎡ 400 mg/㎡ →250 mg/㎡	120分 120分 急速投与 46時間 初回：120分、2回目以降：60分	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1.8	2週間	中等度	
大腸 mFOLFOX6 + Cmaab：2週毎	L-OHP：オキサリプラチン注射液 I-LV：レボレチン注 5-FU：フッピラジール注（急速） 5-FU：フッピラジール注（持続） Cmaab：アビタックス注射液	85 mg/㎡ 200 mg/㎡ 400 mg/㎡ 2400 mg/㎡ 500 mg/㎡	120分 120分 急速投与 46時間 初回：120分、2回目以降：60分	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1	2週毎	中等度	
大腸 mFOLFOX6 + Pmab：2週毎	L-OHP：オキサリプラチン注射液 I-LV：レボレチン注 5-FU：フッピラジール注（急速） 5-FU：フッピラジール注（持続） Pmab：ペグティビックス注射液	85 mg/㎡ 200 mg/㎡ 400 mg/㎡ 2400 mg/㎡ 6 mg/kg	120分 120分 急速投与 46時間 60分	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1	2週毎	中等度	
大腸 mFOLFOX6：2週毎	L-OHP：オキサリプラチン注射液 I-LV：レボレチン注 5-FU：フッピラジール注（急速） 5-FU：フッピラジール注（持続）	85 mg/㎡ 200 mg/㎡ 400 mg/㎡ 2400 mg/㎡	120分 120分 急速投与 46時間	Day1 Day1 Day1 Day1	2週毎	中等度	
大腸 SOX：3週間	L-OHP：オキサリプラチン注射液 S-1：テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	130 mg/㎡ 80-120 mg/Body/Day	120分	Day1 Day1-14	3週間	中等度	
大腸 CAPOX(XELOX)：3週間	L-OHP：オキサリプラチン注射液 Cape：カベシタピン	130 mg/㎡ 2000mg/㎡/Day	120分	Day1 Day1-14	3週間	中等度	
大腸 S-1+BV：3週間	BV：ベパシズマブBS点滴静注 S-1：テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	7.5 mg/kg 80-120 mg/Body/Day	90→60→30分	Day1 Day1-14	3週間	最小	
大腸 RPMI (5-FU+I-LV)：8週間	5-FU：フッピラジール注 I-LV：レボレチン注	500 mg/㎡ 250 mg/㎡	急速投与 120分	Day1,Day8,Day15, Day22,Day29,Day36	8週間	軽度	
大腸 SOX+BV(30min)：3週間	L-OHP：オキサリプラチン注射液 BV：ベパシズマブBS点滴静注 S-1：テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	130 mg/㎡ 7.5 mg/kg 80-120 mg/Body/Day	120分 90→60→30分	Day1 Day1 Day1-14	3週間	中等度	
大腸 ロンサーフ+BV：4週間	BV：ベパシズマブBS点滴静注 ロンサーフ®：トリフルリジン/フルリシール（TAS-102）	5 mg/kg 70-150 mg/Body/Day	90→60→30分	Day1.15 Day1-5,8-12	4週間	軽度	
大腸 カベシタピン+BV：3週間	BV：ベパシズマブBS点滴静注 Cape：カベシタピン	7.5 mg/kg 2000mg/㎡/Day	90→60→30分	Day1 Day1-14	3週間	最小	
大腸 mFOLFOX6 + BV：2週毎	L-OHP：オキサリプラチン注射液 I-LV：レボレチン注 5-FU：フッピラジール注（急速） 5-FU：フッピラジール注（持続） BV：ベパシズマブBS点滴静注	85 mg/㎡ 200 mg/㎡ 400 mg/㎡ 2400 mg/㎡ 5 mg/kg	120分 120分 急速投与 46時間 90→60→30分	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1	2週毎	中等度	
大腸 CAPOX(XELOX)+BV：3週間	L-OHP：オキサリプラチン注射液 BV：ベパシズマブBS点滴静注 Cape：カベシタピン	130 mg/㎡ 7.5 mg/kg 2000mg/㎡/Day	120分 90→60→30分	Day1 Day1 Day1-14	3週間	中等度	
大腸 CAPIRI(XELIRI)+BV：3週間	CPT-11：イリリカ塩酸塩点滴静注 BV：ベパシズマブBS点滴静注 Cape：カベシタピン	200 mg/㎡ 7.5 mg/kg 1600 mg/㎡/Day	90分 90→60→30分	Day1 Day1 Day1-14	3週間	中等度	
大腸 エンコラフェニブ +ビニメチニブ +Cmaab：毎週	Cmaab：アビタックス注射液 エンコラフェニブ：ピラフトピカブセル ビニメチニブ：メクトピカブセル	400 mg/㎡ →250 mg/㎡ 300 mg/Body/Day 90 mg/Body/Day	初回：120分、2回目以降：60分	Day1 連日 連日	毎週	最小	

大腸 CPT-11+BV：2週毎	CPT-11：イリテカン塩酸塩点滴静注液 BV：ペバシズマブ BS点滴静注	150 mg/㎡ 5 mg/kg	90分 90→60→30分	Day1 Day1	2週毎	中等度	
大腸 FOLFIRI + Cmad：2週毎	CPT-11：イリテカン塩酸塩点滴静注液 I-LV：いぶおナート注 5-FU：フクロリチル注（急速） 5-FU：フクロリチル注（持続） Cmad：アビタックス注射液	150 mg/㎡ 200 mg/㎡ 400 mg/㎡ 2400 mg/㎡ 500 mg/㎡	120分 120分 急速投与 46時間 初回：120分、2回目以降：60分	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1	2週毎	中等度	
大腸 FOLFIRI(2週毎) + Cmad(1週毎)	CPT-11：イリテカン塩酸塩点滴静注液 I-LV：いぶおナート注 5-FU：フクロリチル注（急速） 5-FU：フクロリチル注（持続） Cmad：アビタックス注射液	150 mg/㎡ 200 mg/㎡ 400 mg/㎡ 2400 mg/㎡ 400 mg/㎡ →250 mg/㎡	120分 120分 急速投与 46時間 初回：120分、2回目以降：60分	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1	2週毎	中等度	
大腸 FOLFIRI+BV：2週毎	CPT-11：イリテカン塩酸塩点滴静注液 I-LV：いぶおナート注 5-FU：フクロリチル注（急速） 5-FU：フクロリチル注（持続） BV：ペバシズマブ BS点滴静注	150 mg/㎡ 200 mg/㎡ 400 mg/㎡ 2400 mg/㎡ 5 mg/kg	120分 120分 急速投与 46時間 90→60→30分	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1	2週毎	中等度	
大腸 FOLFIRI+Pmab：2週毎	CPT-11：イリテカン塩酸塩点滴静注液 I-LV：いぶおナート注 5-FU：フクロリチル注（急速） 5-FU：フクロリチル注（持続） Pmab：ペクティビックス注射液	150 mg/㎡ 200 mg/㎡ 400 mg/㎡ 2400 mg/㎡ 6 mg/kg	120分 120分 急速投与 46時間 60分	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1	2週毎	中等度	
大腸 FOLFIRI：2週毎	CPT-11：イリテカン塩酸塩点滴静注液 I-LV：いぶおナート注 5-FU：フクロリチル注（急速） 5-FU：フクロリチル注（持続）	150 mg/㎡ 200 mg/㎡ 400 mg/㎡ 2400 mg/㎡	120分 120分 急速投与 46時間	Day1 Day1 Day1 Day1	2週毎	中等度	
【2nd以降】大腸 FOLFIRI+RAM：2週毎	CPT-11：イリテカン塩酸塩点滴静注液 I-LV：いぶおナート注 5-FU：フクロリチル注（急速） 5-FU：フクロリチル注（持続） RAM：サイラムザ注射液	150 mg/㎡ 200 mg/㎡ 400 mg/㎡ 2400 mg/㎡ 8 mg/kg	120分 120分 急速投与 46時間 60分→30分	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1	2週毎	中等度	
大腸 FOLFIRI+AFL：2週毎	CPT-11：イリテカン塩酸塩点滴静注液 I-LV：いぶおナート注 5-FU：フクロリチル注（急速） 5-FU：フクロリチル注（持続） AFL：ザルトラップ点滴静注	150 mg/㎡ 200 mg/㎡ 400 mg/㎡ 2400 mg/㎡ 4 mg/kg	120分 120分 急速投与 46時間 60分	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1	2週毎	中等度	
大腸 IRIS+BV：4週間	CPT-11：イリテカン塩酸塩点滴静注液 BV：ペバシズマブ BS点滴静注 S-1：テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	100 mg/㎡ 5 mg/kg 80-120 mg/Body/Day	90分 90→60→30分	Day1.15 Day1.15 Day1-14	4週間	中等度	
大腸 IRIS：4週間	CPT-11：イリテカン塩酸塩点滴静注液 S-1：テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	100 mg/㎡ 80-120 mg/Body/Day	90分	Day1.15 Day1-14	4週間	中等度	
大腸 SIR+BV：3週間	CPT-11：イリテカン塩酸塩点滴静注液 BV：ペバシズマブ BS点滴静注 S-1：テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	150 mg/㎡ 7.5 mg/kg 80-120 mg/Body/Day	90分 90→60→30分	Day1 Day1 Day1-14	3週間	中等度	
大腸 SIR：3週間	CPT-11：イリテカン塩酸塩点滴静注液 S-1：テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	150 mg/㎡ 80-120 mg/Body/Day	90分	Day1 Day1-14	3週間	中等度	
大腸 CPT-11+BV：2週毎	CPT-11：イリテカン塩酸塩点滴静注液 BV：ペバシズマブ BS点滴静注	150 mg/㎡ 5 mg/kg	90分 90→60→30分	Day1 Day1	2週毎	中等度	
大腸 CPT-11 + Cmad：2週毎	CPT-11：イリテカン塩酸塩点滴静注液 Cmad：アビタックス注射液	150 mg/㎡ 500 mg/㎡	90分 初回：120分、2回目以降：60分	Day1 Day1	2週毎	中等度	
大腸 CPT-11(d1) + Cmad(d1,8)：2週毎	CPT-11：イリテカン塩酸塩点滴静注液 Cmad：アビタックス注射液	150 mg/㎡ 400→250 mg/㎡	90分 初回：120分、2回目以降：60分	Day1 Day1.8	2週毎	中等度	
大腸 CPT-11+Pmab：2週毎	CPT-11：イリテカン塩酸塩点滴静注液 Pmab：ペクティビックス注射液	150 mg/㎡ 6 mg/kg	90分 60分	Day1 Day1	2週毎	中等度	
大腸 CPT-11：2週毎	CPT-11：イリテカン塩酸塩点滴静注液	150 mg/㎡	90分	Day1	2週毎	中等度	
大腸 CAPIRI(XELIRI)：3週間	CPT-11：イリテカン塩酸塩点滴静注液 Cape：カベスタビン	200 mg/㎡ 1600 mg/㎡/Day	90分	Day1 Day1-14	3週間	中等度	

大腸 FOLFOXIRI：2週毎(70カス)	CPT-11：イリリチン塩酸塩点滴静注液	165 mg/㎡	60分	Day1	2週毎	高度	
	L-OHP：オキサリプラチン注射液	85 mg/㎡	120分	Day1			
	I-LV：レボレボネート注	200 mg/㎡	120分	Day1			
	5-FU：フッピロリチル注（持続）	3200 mg/㎡	48時間	Day1			
大腸 FOLFOXIRI+BV：2週毎(70カス)	CPT-11：イリリチン塩酸塩点滴静注液	165 mg/㎡	60分	Day1	2週毎	高度	
	L-OHP：オキサリプラチン注射液	85 mg/㎡	120分	Day1			
	I-LV：レボレボネート注	200 mg/㎡	120分	Day1			
	5-FU：フッピロリチル注（持続）	3200 mg/㎡	48時間	Day1			
	BV：ベバシズマブBS点滴静注	5 mg/kg	90→60→30分	Day1			

免責：本レジメニー覧は、医療従事者を対象にしたものであり、一般の方向けではありません。また本レジメニー覧を参考にレジメンを作成しないでください。当院では、一切の責任を負いません。