

食道癌

※催吐リスク

最小：制吐剤なし、軽度：デキサート、中等度：デキサート+5-HT3受容体遮断薬、

高度：デキサート+5-HT3受容体遮断薬+NK1拮抗薬±オランザピン

レジメン名	薬剤名	投与量	投与時間	投与日	1コース期間	催吐リスク	備考
食道 FP(700/70)：4週間(d1-4)放射線併用	5-FU：700mg/m ² CDDP：50mg/m ²	700 mg/m ² 70 mg/m ²	24時間 2時間	Day1-4（連日） Day1	4週間	高度	JCOG9708（Stage I T1N0M0、化学放射線同時併用療法） ※RT：30Gy/15Fr/3w 4週1コース×2
食道 FP(800/80)：3週間(d1-5) 術前	5-FU：700mg/m ² CDDP：50mg/m ²	800 mg/m ² 80 mg/m ²	24時間 2時間	Day1-5（連日） Day1	3週間	高度	JCOG9907（Stage II/III、術前化学療法）
食道 FP(1000/75)放射線併用：4週間(d1-4)	5-FU：700mg/m ² CDDP：50mg/m ²	1000 mg/m ² 75 mg/m ²	24時間 2時間	Day1-4（連日） Day1	4週間	高度	JCOG0909（Stage II/III（T4を除く）根治的化学放射線療法） RTOG9405※RT：1.8Gy/28日（RTは1.2コースのみ）
食道 FP(800/80)：4週間(d1-5)（recurrence）	5-FU：700mg/m ² CDDP：50mg/m ²	800 mg/m ² 80 mg/m ²	24時間 2時間	Day1-5（連日） Day1	4週間	高度	切除不能再発のEVIDENSはJCOG8807（700/70）だが実臨床ではJCOG9908（術前800/80）3週を4週での使用標準的 進行・再発：PDまで
食道 5-FU+CDGP：4週間（d1-5）±放射線併用	5-FU：700mg/m ² NDP：50mg/m ²	800 mg/m ² 90 mg/m ²	24時間 1時間30分	Day1-5（連日） Day1	4週間	中等度	standard dose FN±RT：JCOG9908, 9905-DI
食道 Low doseCDGP+5-FU：1週間（d1-5）放射線併用	5-FU：700mg/m ² NDP：50mg/m ²	500 mg/Body 10 mg/Body	24時間 1時間	d1-5, 8-13, 15-19, 22-26,	1週間	中等度	投与量絶対値500mgは必要時追加。 原著：浜松医科大学(BMC Cancer 2009, 9:408)
食道 Low doseCDGP+5-FU：4週間（d1-5）(放射線後療法)	5-FU：700mg/m ² NDP：50mg/m ²	500 mg/m ² 14 mg/m ²	24時間 1時間	Day1-5（連日） Day1-5（連日）	4週間	中等度	追加化学療法(RTは併用しない)。d1-5を4週毎、最大5コース。 500mgは必要時追加。 BMC cancer 2009,9:408
食道 DOC：3週毎	DOC：100mg/m ²	70 mg/m ²	1時間	Day1	3週毎	軽度	進行・再発：PDまで
食道 weeklyPTX：4週間（d1,8,15）	PTX：40mg/m ²	80 mg/m ²	1時間	Day1, 8, 15	4週間	軽度	進行・再発：PDまで 添付文書の適応：100 mg/m ² 週1回×6連投、1回休薬まで可能。
食道 mFOLFOX6：2週毎	L-OHP：400mg/m ² I-LV：50mg/m ² 5-FU：700mg/m ² （急速投与） 5-FU：700mg/m ² （持続投与）	85 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	2時間 2時間 5分 46時間	Day1 Day1 Day1 Day1	2週毎	中等度	進行・再発：PDまで
食道 nivolumab：2週毎 食道 nivolumab：4週毎	Nivo：240mg/Body （オプジーボ）	240 mg/Body 480 mg/Body	30分	Day1	2週毎 4週毎	最小	術後補助レジメン：最大12か月まで 進行・再発：PDまで
食道 ニボルマブ(2wg)+イビリムマブ(6wg)：6週間 食道 ニボルマブ(3wg)+イビリムマブ(6wg)：6週間	Nivo：240mg/Body Ipi：40mg/Body （ヤーボイ）	240 mg/(2週)・360 mg/(3週) 1 mg/kg	30分 30分	Day1,(2週):15,29,(3週):22 Day1	6週間	最小	進行・再発：PDまで
食道 FP(800/80)+pembro：3週間	5-FU：700mg/m ² CDDP：50mg/m ² Pembro：200mg/Body	800 mg/m ² 80 mg/m ² 200 mg/Body	24時間 2時間 30分	Day1-5（連日） Day1 Day1	3週間	高度	FP+pembro 6コース施行後、CDDPなし CDDP抜きレジメンあり
食道 DCF(DOC/CDDP/5-FU)：3週間(d1-5)	5-FU：700mg/m ² CDDP：50mg/m ² DOC：100mg/m ²	750 mg/m ² 70 mg/m ² 70 mg/m ²	24時間 2時間 1時間	Day1-5（連日） Day1 Day1	3週間	高度	75歳以下。JCOG1109試験：cStage II/IIIが対象。 最大3コース。ジールスタ併用推奨。

免責：本レジメン一覧は、医療従事者を対象にしたものであり、一般の方向けではありません。また本レジメン一覧を参考にレジメンを作成しないでください。当院では、一切の責任を負いません。