

昭和大学病院 がん薬物療法レジメー一覧 2020年3月

【共通確認事項】

パクリタキセル前投薬：レスタミン（内服）、デキサメタゾン、ファモチジン（点滴）

催吐リスク分類：HECレジメンに関してはアプレピタント（イメド）,5-HT 3拮抗薬,デキサメタゾンを使用

カルボプラチン：HECに準じた扱い

乳がんレジメン（内服）

レジメンコード	レジメン名称	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	1コース期間	催吐リスク分類	備考：
—	BC-S1単独療法 6w4	S1：チカフルギメラシル/オテラナルカリウム	80-120mg/Day（1回40mg/m ² ）	内服 1日2回	Day1-28	6週間毎	—	患者状態によって3w2で治療する場合もあり
—	BC-Cape単独療法(A法)	Cape：カベシタビン（ゼローダ）	1650mg/m ² /Day	内服 1日2回	Day1-21（連日）	4週間毎	—	術後補助化学療法の場合8コース（6か月間投与）:non-pCR症例
—	BC-Cape単独療法(B法)	Cape：カベシタビン（ゼローダ）	2500mg/m ² /Day	内服 1日2回	Day1-14（連日）	3週間毎	—	
—	BC-ラパチニブ/カベシタビン療法	ラパチニブ（タイケルブ） カベシタビン（ゼローダ）	ラパチニブ：1250mg/Day カベシタビン：2000mg/m ² /Day	ラパチニブ：内服 1日1回 食間 カベシタビン：内服 1日2回	ラパチニブ：Day1-21（連日） カベシタビン：Day1-14（連日）	3週間毎	—	HER2過剰発現が確認された進行性又は転移性乳癌治療
—	BC-ラパチニブ/レトロゾール療法	ラパチニブ（タイケルブ） レトロゾール（フェマーラ）	ラパチニブ：1500mg/Day レトロゾール：2.5mg/Day	ラパチニブ：内服 1日1回 食間 レトロゾール：内服 1日1回	連日	（休薬なし）	—	ホルモン受容体陽性、閉経後の進行性又は転移性乳癌治療
—	BC-エキセメスタン/エペロリムス療法	エキセメスタン（アロマソン） エペロリムス（アフィニール）	エキセメスタン：25mg/Day エペロリムス：10mg/Day	内服 1日1回	連日	（休薬なし）	—	閉経後ホルモン受容体陽性・再発乳癌の2次、3次内分泌治療
—	BC-バルボシクリブ/レトロゾール療法	バルボシクリブ（イブランス） レトロゾール（フェマーラ）	バルボシクリブ：75-125mg/Day レトロゾール：2.5mg/Day	内服 1日1回	バルボシクリブ：Day1-21（連日） レトロゾール：Day1-28(連日)	4週間毎	—	閉経後ホルモン受容体陽性・再発乳癌の内分泌治療，血液毒性有
—	BC-バルボシクリブ/フルベストラント療法	バルボシクリブ（イブランス） フルベストラント（注射）	バルボシクリブ：75-125mg/Day フルベストラント：1回500mg筋注 2週→4週毎	内服 1日1回	バルボシクリブ：Day1-21（連日）	4週間毎	—	フルベストラントは1コース目は14日間毎2コース目から28日毎に投与
—	BC-アベマシクリブ /レトロゾール or アナストロゾール療法	アベマシクリブ（ベージニオ） レトロゾール（フェマーラ） or アナストロゾール（アリミデックス）	アベマシクリブ：100-300mg/Day レトロゾール：2.5mg/Day or アナストロゾール1mg/Day	アベマシクリブ：内服 1日2回 レトロゾール or アナストロゾール：内服 1日1回	連日	（休薬なし）	—	閉経後ホルモン受容体陽性・再発乳癌の内分泌治療，血液毒性有
—	BC-アベマシクリブ/フルベストラント療法	アベマシクリブ（ベージニオ） フルベストラント（フェゾロデックス）	アベマシクリブ：100-300mg/Day フルベストラント：1回500mg筋注 2週→4週毎	内服 1日2回	連日	（休薬なし）	—	フルベストラントは1コース目は14日間毎2コース目から28日毎に投与
—	BC-オラパリブ療法	オラパリブ（リムバース）	400-600mg/Day	内服 1日2回	連日	（休薬なし）	—	がん化学療法歴のあるBRCA遺伝子変異陽性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌

免責：本レジメー一覧は、医療従事者を対象にしたものであり、一般の方向けではありません。また本レジメー一覧を参考にレジメンを作成しないでください。当院では、一切の責任を負いません。