

昭和大学病院 がん薬物療法レジメニー覧 2020年3月

【共通確認事項】

ラムシムブ (サイラムザ) 前投薬: レスタミン (内服)

パクリタセル前投薬: レスタミン (内服)、デキメタゾン、フェモジソン (点滴)

催吐リスク分類: HECレジメンに関してはアプレピタント, 5-HT 3拮抗薬, デキメタゾンを使用

胆管・胆道がんレジメン

レジメンコード	レジメン名称	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	1コース期間	催吐リスク分類	備考:
082001	BTC-CDDP/GEM 3w2	CDDP: シスプラチン GEM: ゲムシタビン	25mg/m ² 1000mg/m ²	1時間 30分	Day1, 8 Day1, 8	3週間毎	MEC (CDDP少量投与のため)	進行・再発: PDまで
082002	BTC-GEM 4w3	GEM: ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	Day1, 8, 15	4週間毎	LEC	進行・再発: PDまで
082003	BTC-GEM/S1 3w2	GEM: ゲムシタビン S1: テガフルギメタシル/オテラシルカリウム	1000mg/m ² 60-120mg/Day (60mg/m ² /Day)	30分 内服 1日2回	Day1, 8 Day1-14	3週間毎	LEC	進行・再発: PDまで
082004	BTC-GCS 2w	CDDP: シスプラチン GEM: ゲムシタビン S1: テガフルギメタシル/オテラシルカリウム	25mg/m ² 1000mg/m ² 80-120mg/Day (80mg/m ² /Day)	1時間 30分 内服 1日2回	Day1 Day1 Day1-7	2週間毎	MEC (CDDP少量投与のため)	進行・再発: PDまで
—	BTC-S1単独療法 6w4	S1: テガフルギメタシル/オテラシルカリウム	80-120mg/Day	内服 1日2回 1回40mg/m ²	Day1-28	6週間毎		患者状態によって3w2で治療する場合もあり

免責: 本レジメニー覧は、医療従事者を対象にしたものであり、一般の方向けではありません。また本レジメニー覧を参考にレジメンを作成しないでください。当院では、一切の責任を負いません。