【共通確認事項】

ラムシルマ[®]（サイラムザ[®]）前投薬：ボララミン（点滴）

パクリタセル前投薬：ボララミン、デキメタ[®]ン、フアモジ[®]ン（点滴）

催吐リスク分類：HECレジメンに関しては7[®]レビタ[®]ント,5-HT 3拮抗薬,デキメタ[®]ン,オンザ[®]ピンを使用

食道がんレジメ

レジメコード	レジメ名称	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	1コース期間	催吐リスク分類	備考：
141001	食道-5FU+NDP 3w(NAC)	5-FU：フルオロウラシル NDP：ネダ [®] ブラチン	1000mg/Body 20mg/Body	24時間 1時間30分	Day1-5（連日） Day1-5（連日）	3週間毎	MEC	術前化学療法 ②コース施行
141002	食道-5FU+NDP 4w	5-FU：フルオロウラシル NDP：ネダ [®] ブラチン	800mg/m ² 90mg/m ²	24時間 1時間30分	Day1-5（連日） Day1	4週間毎	MEC	進行・再発：PDまで
142003	食道-DTX 3w（ドセタキセル）	DTX：ドセタキセル	70mg/m ²	1時間	Day1	3週間毎	LEC	進行・再発：PDまで
141004	食道-FP(1000/75) 4w + RT	5-FU：フルオロウラシル CDDP：シス [®] プラチン	1000mg/m ² 75mg/m ²	24時間 2時間	Day1-4（連日） Day1	4週間毎	HEC	化学放射線療法
141005	食道-FP(700/70) 4w + RT	5-FU：フルオロウラシル CDDP：シス [®] プラチン	700mg/m ² 70mg/m ²	24時間 2時間	Day1-4（連日） Day1	4週間毎	HEC	化学放射線療法
141006	食道-FP(800/80) 3w (NAC)	5-FU：フルオロウラシル CDDP：シス [®] プラチン	800mg/m ² 80mg/m ²	24時間 2時間	Day1-5（連日） Day1	3週間毎	HEC	術前化学療法 ②コース施行
141007	食道-FP(800/80) 4w	5-FU：フルオロウラシル CDDP：シス [®] プラチン	800mg/m ² 80mg/m ²	24時間 2時間	Day1-5（連日） Day1	4週間毎	HEC	進行・再発：PDまで
141008	食道-Low-Dose-FP/RT 6w 6	5-FU：フルオロウラシル CDDP：シス [®] プラチン	200mg/m ² 5mg/m ²	24時間 2時間	Day1-5, 8-12, 15-19, 22-26, 29-33, 36-40	6週間毎	LEC	RT（放射線）：2Gy×30日 Total 60Gy 5日間×6週 RT施行中はRTと併用して点滴を投与する
142009	食道-PTX 7w6（パクリタセル7w6）	PTX：パクリタセル	100mg/m ²	1時間	Day1, 8, 15, 22, 29, 36	7週間毎	LEC	進行・再発：PDまで
141010	食道-DCF 3w (NAC)	5-FU：フルオロウラシル CDDP：シス [®] プラチン DTX：ドセタキセル	750mg/m ² 70mg/m ² 70mg/m ²	24時間 2時間 1時間	Day1-5（連日） Day1 Day1	3週間毎	HEC	術前化学療法 ③コース施行
141011	食道-FOLFOX 2w	L-OHP：オキサリプラチン I-LV：レボレボネート 5-FU：フルオロウラシル（急速投与） 5-FU：フルオロウラシル（持続投与）	85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 1600mg/m ²	2時間 2時間 5分 46時間（外来インフューザー・ポンプ）	Day1 Day1 Day1 Day1-2	2週間毎	MEC	進行・再発：PDまで
142012 142015	食道-オブジーボ 2w 食道-オブジーボ 4w	Nivo：ニボルマ [®] （オプジーボ [®] ）	240mg/Body 480mg/Body	30分	Day1	2週間毎 4週間毎	LEC	術後補助・進行・再発：PDまで

142013 142014	食道-キイトルーダ 3w 食道-キイトルーダ 6w	Pemb: ペムブ`ロリス`マブ` (キイトルーダ)	200mg/Body 400mg/Body	30分	Day1	3週間毎 6週間毎	LEC	進行・再発: PDまで
141016	食道-FP(800/80)+Pemb 3w	5-FU: フルオロウラシル CDDP: シスプラチン Pemb: ペムブ`ロリス`マブ`	800mg/m ² 80mg/m ² 200mg/Body	24時間 2時間 30分	Day1-5 (連日) Day1 Day1	3週間毎	HEC	CDDP抜きレジメンもあり
142017	食道-Nivo 3w+Ipi 6w(3週間法) 食道-Nivo 2w+Ipi 6w(2週間法)	Nivo: ニボルマブ` (オプジーボ`) Ipi: イピリマブ` (ヤーポイ)	360mg/(3週)・240mg/(2週) 1mg/kg	30分 30分	Day1,22 (3週),15,29 (2週) Day1	6週間毎	LEC	進行・再発: PDまで
141018	食道-FP(800/80)+Nivo 4w 食道-FP(800/80) 4w+Nivo 2w	5-FU: フルオロウラシル CDDP: シスプラチン Nivo: ニボルマブ` (オプジーボ`)	800mg/m ² 80mg/m ² 480mg/(4週)・240mg/(2週)	24時間 2時間 30分	Day1, (4週) Day1,15 (2週)	4週間毎	HEC	CDDP抜きレジメンもあり
142019	食道-Biweekly DCF 4w2	5-FU: フルオロウラシル CDDP: シスプラチン DTX: ドセタキセル	800mg/m ² 80mg/m ² 30mg/m ²	24時間 2時間 1時間	Day1-5 (連日) Day1 Day1,15	4週間毎	HEC	進行・再発: PDまで

免責：本レジメン一覧は、医療従事者を対象にしたものであり、一般の方向けではありません。また本レジメン一覧を参考にレジメンを作成しないでください。当院では、一切の責任を負いません。