

【共通確認事項】

胆管・胆道がんレジメン

ラムシルマブ（サイラムザ）等 前投薬：ボララミン（点滴）
パクリタキセル前投薬：ボララミン、デキサメタゾン、フモチジン（点滴）
催吐リスク分類：HECレジメンに関してはアプレピタント、5-HT 3拮抗薬、デキサメタゾン、オンザピンを使用

レジメンコード	レジメン名称	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	1コース期間	催吐リスク分類	備考：
082001	胆道-GEM+CDDP 3w2	CDDP：シスプラチン GEM：ゲムシタビン	25mg/m ² 1000mg/m ²	1時間 30分	Day1, 8 Day1, 8	3週間毎	MEC (CDDP少量投与のため)	進行・再発：PDまで
082002	胆道-GEM 4w3	GEM：ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	Day1, 8, 15	4週間毎	LEC	進行・再発：PDまで
082003	胆道-GEM/S1 3w2	GEM：ゲムシタビン S1：テカフル/キメラシル/オテラシルカリウム	1000mg/m ² 60-120mg/Day (60mg/m ² /Day)	30分 内服 1日2回	Day1, 8 Day1-14	3週間毎	LEC	進行・再発：PDまで
082004	胆道-GCS 2w	CDDP：シスプラチン GEM：ゲムシタビン S1：テカフル/キメラシル/オテラシルカリウム	25mg/m ² 1000mg/m ² 80-120mg/Day (80mg/m ² /Day)	1時間 30分 内服 1日2回	Day1 Day1 Day1- 7	2週間毎	MEC (CDDP少量投与のため)	進行・再発：PDまで
082005	胆道-GEM+CDDP+Dur 3w2	CDDP：シスプラチン GEM：ゲムシタビン Dur：デュルバルマブ（イミフィンジ）	25mg/m ² 1000mg/m ² 1500mg/Body	1時間 30分 1時間	Day1, 8 Day1, 8 Day1	3週間毎	MEC (CDDP少量投与のため)	進行・再発：PDまで 1-8コースまで以降はDurのみ
082006	胆道-イミフィンジ 4w	Dur：デュルバルマブ（イミフィンジ）	1500mg/Body	1時間	Day1	4週間毎	LEC	進行・再発：PDまで
082007	胆道-GEM+CDDP+Pemb 3w2	CDDP：シスプラチン GEM：ゲムシタビン Pemb：ペムズマブ	25mg/m ² 1000mg/m ² 200mg/Body	1時間 30分 30分	Day1, 8 Day1, 8 Day1	3週間毎	MEC (CDDP少量投与のため)	進行・再発：PDまで 1-8コースまで以降はPemb+GEMのみ
—	胆道-S1単独療法 6w4	S1：テカフル/キメラシル/オテラシルカリウム	80-120mg/Day	内服 1日2回 1回40mg/m ²	Day1-28	6週間毎		患者状態によって3w2で治療する場合もあり

免責：本レジメニー覧は、医療従事者を対象にしたものであり、一般の方向けではありません。また本レジメニー覧を参考にレジメンを作成しないでください。当院では、一切の責任を負いません。