

肺がんレジメン

| レジメンコード | レジメン名称        | 薬剤名                    | 1日投与量                       | 投与時間                                       | 投与日     | 1コース期間 | 催吐リスク分類 | 備考：                                  |
|---------|---------------|------------------------|-----------------------------|--|---------|--------|---------|--------------------------------------|
| —       | LC-S1単独療法 6w4 | S1：テガフルキメタシル/オラテシルカリウム | 80-120mg/Body               | 内服 1日2回 1回40mg/㎡                           | Day1-28 | 6週間毎   | LEC     | 患者状態によって3w2で治療する場合もあり                |
| —       | LC-ゲフィチニブ療法   | イレッサ（ゲフィチニブ）           | 250mg/Day<br>（副作用に応じて減量あり）  | 内服 1日1回 1回250mg                            | 連日      | -      | 最小度     | EGFR遺伝子変異陽性の場合のみ                     |
| —       | LC-エルロチニブ療法   | タルセバ（エルロチニブ）           | 150mg/Day<br>（副作用に応じて減量あり）  | 内服 1回150mgを食事の1時間以上前、又は食後2時間以降に1日1回経口投与 連日 | 連日      | -      | 最小度     | EGFR遺伝子変異陽性の場合のみ                     |
| —       | LC-アファチニブ療法   | ジオトリフ（アファチニブ）          | 40mg/Day<br>（副作用に応じて増・減量あり） | 内服 1日1回40mg 空腹時                            | 連日      | -      | LEC     | EGFR遺伝子変異陽性の場合のみ                     |
| —       | LC-オシメルチニブ療法  | タグリッソ（オシメルチニブ）         | 80mg/Day<br>（副作用に応じて減量あり）   | 内服 1日1回 1回80mg                             | 連日      | -      | -       | EGFR遺伝子変異陽性の場合<br>術後補助化学療法でも使用       |
| —       | LC-ダコミチニブ療法   | ビジンプロ（ダコミチニブ）          | 45mg/Day<br>（副作用に応じて減量あり）   | 内服 1日1回 1回45mg                             | 連日      | -      | -       | EGFR遺伝子変異陽性の場合のみ                     |
| —       | LC-クリゾチニブ療法   | ザーコリ（クリゾチニブ）           | 500mg/Day<br>（副作用に応じて減量あり）  | 内服 1日2回 1回250mg                            | 連日      | -      | MEC     | ALK融合遺伝子陽性、またはROS1融合遺伝子陽性の場合のみ       |
| —       | LC-アレクチニブ療法   | アレセンサ（アレクチニブ）          | 600mg/Day<br>（副作用に応じて減量あり）  | 内服 1日2回 1回300mg                            | 連日      | -      | LEC     | ALK融合遺伝子陽性の場合のみ、1次治療で使用・術後補助でも使用     |
| —       | LC-セリチニブ療法    | ジカディア（セリチニブ）           | 450mg/Day<br>（副作用に応じて減量あり）  | 食後内服 1日1回 1回450mg                          | 連日      | -      | MEC     | ALK融合遺伝子陽性の場合のみであり、クリゾチニブ治療後の2次治療で使用 |
| —       |               |                        |                             |  |         |        |         |                                      |
| —       |               |                        |                             |  |         |        |         |                                      |

免責：本レジメニー覧は、医療従事者を対象にしたものであり、一般の方向けではありません。また本レジメニー覧を参考にレジメンを作成しないでください。当院では、一切の責任を負いません。