

院外処方箋に表記されている検査値一覧表

表示項目	項目	単位	基準値	説明	パニック値（電話報告基準）	
					下限	上限
WBC	白血球数	[10 ³ /μL]	3.5-9.0	好中球やリンパ球などの白血球の総数です。	2.0	30.0
Hb	ヘモグロビン（血色素量）	[g/dL]	男性： 14.0-18.0 女性： 12.0-16.0	赤血球中の酸素を運ぶたんぱく質です。貧血で低下します。	8.0	18.0
Plt	血小板数	[10 ⁴ /μL]	15.0-40.0	止血のために働く血球の数です。	7.0	100.0
PT-INR	プロトロンビン時間	-	-	血液凝固（出血時に自然に血液が固まるしくみ）の異常の原因を調べるのに役立ちます。増加している場合出血しやすい（血が止まりにくい）状態といえます。ワルファリン治療時の指標にもなります。肝機能が低下している場合にも異常値を示しやすいため、肝機能の指標にもなります。	-	-
AST	アスパラギン酸 アミノトランスフェラーゼ	[U/L]	13-30	肝臓・心臓の障害の指標です。	-	500
ALT	アラニン アミノトランスフェラーゼ	[U/L]	男性： 10-42 女性： 7-23	肝臓の障害の指標です。	-	500
T-Bil	総ビリルビン	[mg/dL]	0.3-1.0	黄疸の程度を示します。	-	5.0
血清Cr	血清クレアチニン	[mg/dL]	男性： 0.6-1.2 女性： 0.5-0.9	腎臓の働きをみる検査です。	-	4.0
eGFR	推算糸球体濾過量	[mL/min/1.73m ²]	-	血清Crから計算された腎機能の指標です。体表面積1.73m ² あたりの値で表示しています。	-	-
CK	クレアチンキナーゼ	[U/L]	男性： 59-248 女性： 41-153	筋肉に含まれる酵素です。心筋梗塞や筋肉の病気で増加します。	-	1500
CRP	C反応性たんぱく	[mg/dL]	0.2以下	炎症マーカーとして用いられます。感染症の場合にも高値になります。	-	15.0
K	カリウム	[mEq/L]	3.6-5.1	血液中の電解質の濃度です。	2.0	6.0
HbA1c	ヘモグロビンA1c	[%]	4.6-6.2	血糖コントロールの指標です。国際基準値で示しています。	-	-