

がん種		レジメン名	薬品名/基本投与量/スケジュール・投与間隔			
悪性骨腫瘍・軟部肉腫	骨肉軟	ADM	アドリアマイシン	75 mg/m ²	d1	3週
悪性骨腫瘍・軟部肉腫	骨肉軟	ADM+IFM	ドキシルピシン	30 mg/m ²	d1,2	3週
			イホマイド	2000 mg/m ²	d1-5	
悪性骨腫瘍・軟部肉腫	骨肉軟	Trabectedin【3W】	ヨンデリス	1.2 mg/m ²	d1	3週
悪性骨腫瘍・軟部肉腫	骨肉軟	エリブリン【3w】	エリブリン	1.4 mg/m ²	d1,8	3週
神経内分泌腫瘍	NET	STZ	ザノサー	1000-1500 mg/m ²	d1	1週
皮膚がん	皮膚	IPI+NIVO	オブジーボ	1 mg/kg	d1,22,43,64	
			ヤーボイ	3 mg/kg	d1,22,43,64	3週
			オブジーボ	3 mg/kg	d85以降 2週毎	
皮膚がん	皮膚	NIVO【2W】	オブジーボ	240 mg/body	d1	2週
皮膚がん	皮膚	NIVO【4W】	オブジーボ	480 mg/body	d1	4週
脳腫瘍	脳	ANCU (1コース)	ニドラン	80 mg/m ²	day1,36	
脳腫瘍	脳	ANCU (2-12コース)	ニドラン	80 mg/m ²	day1	8週
脳腫瘍	脳	脳 Bmab+TMZ (初・再発150mg/m ²)	アバスチン	10 mg/kg	d1,15	4週
			テモダール	150 mg/m ²	d1-5	
脳腫瘍	脳	脳 Bmab+TMZ (初・再発200mg/m ²)	アバスチン	10 mg/kg	d1,15	4週
			テモダール	200 mg/m ²	d1-5	
脳腫瘍	脳	脳 Bmab+TMZ (初発1回目75mg/m ²)	アバスチン	10 mg/kg	d1,15,29,42	70週
			テモダール	75 mg/m ²	d1-42	
脳腫瘍	脳	脳 Bmab+TMZ (内服)	アバスチン	10 mg/kg	d1,15,29,42	4週
			テモダール	75 mg/m ²	d1-42	
脳腫瘍	脳	脳 Bmab+TMZ (内服)	アバスチン	10 mg/kg	d1,15	4週
			テモダール	150 mg/m ²	d1-5	
脳腫瘍	脳	脳 Bmab+TMZ (内服)	アバスチン	10 mg/kg	d1,15	4週
			テモダール	200 mg/m ²	d1-5	
脳腫瘍	脳	脳 Bmab単独 (維持)	アバスチン	15 mg/kg	d1	3週