

| がん種 | レジメン名 | 薬品名/基本投与量/スケジュール・投与間隔 |
|------|---------------------------------|--------------------------|
| 食道がん | 食道 FOLFOX+RT 【2W】 | オキサリプラチン 85 mg/m2 d1 |
| | | レボホリナート 200 mg/m2 d1 |
| | | 5-FU 400 mg/m2 d1 |
| | | 5-FU 1600 mg/m2 d1 |
| 食道がん | 食道 FOLFOX+Nivo 【2w】 | オブジーボ 240 mg/body d1 |
| | | オキサリプラチン 85 mg/m2 d1 |
| | | レボホリナート 200 mg/m2 d1 |
| | | 5-FU 400 mg/m2 d1 |
| 食道がん | 食道 FP 700,70 +RT 【4w】 | 5-FU 2400 mg/m2 d1 |
| | | シスプラチン 70 mg/m2 d1 |
| | | 5-FU 700 mg/m2 d1-4 |
| | | 5-FU 700 mg/m2 d1-4 |
| 食道がん | 食道 FP 800,80 【4w】 | シスプラチン 80 mg/m2 d1 |
| | | 5-FU 800 mg/m2 d1-5 |
| | | 5-FU 800 mg/m2 d1-5 |
| | | 5-FU 800 mg/m2 d1-5 |
| 食道がん | 食道 Pembro+FP 【3w】 | キイトルーダ 200 mg/body d 1 |
| | | シスプラチン 80 mg/m2 d1 |
| | | フルオロウラシル 800 mg/m2 d1-5 |
| | | フルオロウラシル 800 mg/m2 d1-5 |
| 食道がん | 食道 Pembro+FP (分割) 【3w】 | キイトルーダ 200 mg/body d 1 |
| | | シスプラチン 20 mg/m2 d1-4 |
| | | フルオロウラシル 800 mg/m2 d1-4 |
| | | フルオロウラシル 800 mg/m2 d1-4 |
| 食道がん | 食道 NIVO 【2W】 | オブジーボ 240 mg/body d1 |
| | | オブジーボ 360 mg/body d1、22 |
| 食道がん | 食道 Ipi+Nivo 【6w】 | ヤーボイ 1 mg/kg d1 |
| | | ヤーボイ 1 mg/kg d1 |
| 食道がん | 食道 NIVO 【4W】 | オブジーボ 480 mg/body d1 |
| | | オブジーボ 480 mg/body d1 |
| 胃がん | 胃 CPT-11 【2w】 | カンプト 150 mg/m2 d1 |
| | | カンプト 150 mg/m2 d1 |
| 胃がん | 胃 DS (3wDTX + S1) 【3w】 | ドセタキセル 40 mg/m2 d1 |
| | | S1 80 mg/m2 d1-14 |
| | | オキサリプラチン 100 mg/m2 d1 |
| | | S1 80 mg/m2 d1-14 |
| 胃がん | 胃 G-SOX 【3w】 | オブジーボ 360 mg/body d1 |
| | | オキサリプラチン 130 mg/m2 d1 |
| | | S1 80 mg/m2 d1-14 |
| | | S1 80 mg/m2 d1-14 |
| 胃がん | 胃 G-SOX+Nivo 【3w】 | オブジーボ 360 mg/body d1 |
| | | オキサリプラチン 130 mg/m2 d1 |
| | | S1 80 mg/m2 d1-14 |
| | | S1 80 mg/m2 d1-14 |
| 胃がん | 胃 CapOX+Pembro 【3w】 | キイトルーダ 200 mg/body d1 |
| | | オキサリプラチン 130 mg/m2 d1 |
| | | カベシタピン 2000 mg/m2 d1-14 |
| | | カベシタピン 2000 mg/m2 d1-14 |
| 胃がん | 胃 Zolbe+FOLFOX6 【2w】 (初回) | ピロイ 800 mg/body d1 |
| | | オキサリプラチン 85 mg/m2 d1 |
| | | レボホリナート 200 mg/m2 d1 |
| | | 5-FU 400 mg/m2 d1 |
| 胃がん | 胃 Zolbe+FOLFOX6 【2w】 (2コース目以降) | 5-FU 2400 mg/m2 d1 |
| | | ピロイ 400 mg/body d1 |
| | | オキサリプラチン 85 mg/m2 d1 |
| | | レボホリナート 200 mg/m2 d1 |
| 胃がん | 胃 Zolbe+CapOX 【3w】 (初回) | 5-FU 400 mg/m2 d1 |
| | | ピロイ 800 mg/body d1 |
| | | オキサリプラチン 130 mg/m2 d1 |
| | | カベシタピン 2000 mg/m2 d1-14 |
| 胃がん | 胃 Zolbe+CapOX 【3w】 (2コース目以降) | ピロイ 600 mg/body d1 |
| | | オキサリプラチン 130 mg/m2 d1 |
| | | カベシタピン 2000 mg/m2 d1-14 |
| | | カベシタピン 2000 mg/m2 d1-14 |
| 胃がん | 胃 Zolbe+SOX 【3w】 (初回) | ピロイ 800 mg/body d1 |
| | | オキサリプラチン 130 mg/m2 d1 |
| | | S1 80 mg/m2 d1-14 |
| | | S1 80 mg/m2 d1-14 |
| 胃がん | 胃 Zolbe+SOX 【3w】 (2コース目以降) | ピロイ 600 mg/body d1 |
| | | オキサリプラチン 130 mg/m2 d1 |
| | | S1 80 mg/m2 d1-14 |
| | | S1 80 mg/m2 d1-14 |
| 胃がん | 胃 NIVO 【2W】 | オブジーボ 240 mg/body d1 |
| | | オブジーボ 240 mg/body d1 |
| 胃がん | 胃 NIVO 【4W】 | オブジーボ 480 mg/body d1 |
| | | オブジーボ 480 mg/body d1 |
| 胃がん | 胃 Rmab 【2w】 | サイラムザ 8 mg/kg d1 |
| | | サイラムザ 8 mg/kg d1 |
| 胃がん | 胃 SP (S1 + CDDP) | シスプラチン 60 mg/m2 d8 |
| | | S1 80 mg/m2 d1-21 |
| | | S1 80 mg/m2 d1-21 |
| | | S1 80 mg/m2 d1-21 |
| 胃がん | 胃 TZB+SOX | ハーセプチン 6~8 mg/kg d1 |
| | | エルブラット 100 mg/m2 d1 |
| | | S1 80 mg/m2 d1-14 |
| | | S1 80 mg/m2 d1-14 |
| 胃がん | 胃 Pembro+TZB+CapOX 【3w】 (初回) | キイトルーダ 200 mg/body d1 |
| | | トラスツズマブ 8 mg/kg d1 |
| | | オキサリプラチン 130 mg/m2 d1 |
| | | カベシタピン 2000 mg/m2 d1-14 |
| 胃がん | 胃 Pembro+TZB+CapOX 【3w】 (2回目以降) | キイトルーダ 200 mg/body d1 |
| | | トラスツズマブ 6 mg/kg d1 |
| | | オキサリプラチン 130 mg/m2 d1 |
| | | カベシタピン 2000 mg/m2 d1-14 |
| 胃がん | 胃 DS8201 (T-Dxd) 【3w】 | エンハーツ 6.4 mg/kg d1 |
| | | エンハーツ 6.4 mg/kg d1 |
| 胃がん | 胃 wNabPTX | アブラキサソ 100 mg/m2 d1,8,15 |
| | | アブラキサソ 100 mg/m2 d1,8,15 |
| 胃がん | 胃 wPTX | バクリタキセル 80 mg/m2 d1,8,15 |
| | | バクリタキセル 80 mg/m2 d1,8,15 |
| 胃がん | 胃 wPTX+Rmab | サイラムザ 8 mg/kg d1,15 |
| | | サイラムザ 8 mg/kg d1,15 |
| 胃がん | 胃 wPTX+Rmab | バクリタキセル 80 mg/m2 d1,8,15 |
| | | バクリタキセル 80 mg/m2 d1,8,15 |

| | | | | | | |
|------|----|----------------------|----------|---------------|-------|----|
| 大腸がん | 大腸 | Cmab | アービタックス | 250~400 mg/m2 | d1,8 | 1週 |
| 大腸がん | 大腸 | CPT-11 + Cmab | アービタックス | 250~400 mg/m2 | d1,8 | 2週 |
| | | | カンプト | 150 mg/m2 | d1 | |
| 大腸がん | 大腸 | CPT-11+Bi-Cmab 【2W】 | イリノテカン | 150 mg/m2 | d1 | 2週 |
| | | | アービタックス | 500 mg/m2 | d1 | |
| 大腸がん | 大腸 | Pmab+Sotorasib 【2w】 | ベクティビックス | 6 mg/kg | d1 | 2週 |
| | | | ルマケラス | 960 mg/body | 連日 | |
| | | | レボホリナート | 200 mg/m2 | d1 | |
| 大腸がん | 大腸 | FOLFIRI | 5-FU | 400 mg/m2 | d1 | 2週 |
| | | | 5-FU | 2400 mg/m2 | d1 | |
| | | | カンプト | 150 mg/m2 | d1 | |
| | | | レボホリナート | 200 mg/m2 | d1 | |
| 大腸がん | 大腸 | FOLFIRI + Bmab | 5-FU | 400 mg/m2 | d1 | 2週 |
| | | | 5-FU | 2400 mg/m2 | d1 | |
| | | | カンプト | 150 mg/m2 | d1 | |
| | | | アバステチン | 5 mg/kg | d1 | |
| | | | アービタックス | 250~400 mg/m2 | d1,8 | |
| 大腸がん | 大腸 | FOLFIRI + Cmab | レボホリナート | 200 mg/m2 | d1 | 2週 |
| | | | カンプト | 150 mg/m2 | d1 | |
| | | | 5-FU | 400 mg/m2 | d1 | |
| | | | 5-FU | 2400 mg/m2 | d1 | |
| 大腸がん | 大腸 | FOLFIRI + Pmab | ベクティビックス | 6 mg/kg | d1 | 2週 |
| | | | レボホリナート | 200 mg/m2 | d1 | |
| | | | カンプト | 150 mg/m2 | d1 | |
| | | | 5-FU | 400 mg/m2 | d1 | |
| | | | 5-FU | 2400 mg/m2 | d1 | |
| 大腸がん | 大腸 | FOLFIRI+Bi-Cmab 【2W】 | アービタックス | 500 mg/m2 | d1 | 2週 |
| | | | レボホリナート | 200 mg/m2 | d1 | |
| | | | カンプト | 150 mg/m2 | d1 | |
| | | | 5-FU | 400 mg/m2 | d1 | |
| | | | 5-FU | 2400 mg/m2 | d1 | |
| 大腸がん | 大腸 | Rmab+FOLFIRI | サイラムザ | 8 mg/kg | d1 | 2週 |
| | | | レボホリナート | 200 mg/m2 | d1 | |
| | | | 5-FU | 400 mg/m2 | d1 | |
| | | | 5-FU | 2400 mg/m2 | d1 | |
| | | | カンプト | 180 mg/m2 | d1 | |
| 大腸がん | 大腸 | FOLFOX6 | レボホリナート | 200 mg/m2 | d1 | 2週 |
| | | | エルブラット | 85 mg/m2 | d1 | |
| | | | 5-FU | 400 mg/m2 | d1 | |
| 大腸がん | 大腸 | FOLFOX6 + Bmab | 5-FU | 2400 mg/m2 | d1 | 2週 |
| | | | アバステチン | 5 mg/kg | d1 | |
| | | | レボホリナート | 200 mg/m2 | d1 | |
| | | | エルブラット | 85 mg/m2 | d1 | |
| | | | 5-FU | 400 mg/m2 | d1 | |
| 大腸がん | 大腸 | FOLFOX6 + Cmab | アービタックス | 250~400 mg/m2 | d1,8 | 2週 |
| | | | レボホリナート | 200 mg/m2 | d1 | |
| | | | エルブラット | 85 mg/m2 | d1 | |
| | | | 5-FU | 400 mg/m2 | d1 | |
| | | | 5-FU | 2400 mg/m2 | d1 | |
| 大腸がん | 大腸 | FOLFOX6 + Pmab | ベクティビックス | 6 mg/kg | d1 | 2週 |
| | | | レボホリナート | 200 mg/m2 | d1 | |
| | | | エルブラット | 85 mg/m2 | d1 | |
| | | | 5-FU | 400 mg/m2 | d1 | |
| | | | 5-FU | 2400 mg/m2 | d1 | |
| 大腸がん | 大腸 | EC+FOLFOX 【2w】 | ピラフトビ | 300 mg/body | d1 | 2週 |
| | | | アービタックス | 500 mg/m2 | d1 | |
| | | | レボホリナート | 200 mg/m2 | d1 | |
| | | | オキサリプラチン | 85 mg/m2 | d1 | |
| | | | 5-FU | 400 mg/m2 | d1 | |
| 大腸がん | 大腸 | mFOLFOX+Bi-Cmab 【2W】 | 5-FU | 2400 mg/m2 | d1 | 2週 |
| | | | アービタックス | 500 mg/m2 | d1 | |
| | | | レボホリナート | 200 mg/m2 | d1 | |
| | | | エルブラット | 85 mg/m2 | d1 | |
| | | | 5-FU | 400 mg/m2 | d1 | |
| 大腸がん | 大腸 | FOLFOXIRI | レボホリナート | 200 mg/m2 | d1 | 2週 |
| | | | カンプト | 150 mg/m2 | d1 | |
| | | | オキサリプラチン | 85 mg/m2 | d1 | |
| | | | 5-FU | 400 mg/m2 | d1 | |
| | | | 5-FU | 2400 mg/m2 | d1 | |
| 大腸がん | 大腸 | FOLFOXIRI + Bmab | アバステチン | 5 mg/kg | d1 | 2週 |
| | | | レボホリナート | 200 mg/m2 | d1 | |
| | | | カンプト | 150 mg/m2 | d1 | |
| | | | オキサリプラチン | 85 mg/m2 | d1 | |
| | | | 5-FU | 400 mg/m2 | d1 | |
| 大腸がん | 大腸 | IRIS+Bmab | 5-FU | 2400 mg/m2 | d1 | 4週 |
| | | | S1 | 80 mg/m2 | d1-14 | |
| | | | アバステチン | 5 mg/kg | d1,15 | |
| 大腸がん | 大腸 | Pmab | カンプト | 100 mg/m2 | d1,15 | 2週 |
| | | | ベクティビックス | 6 mg/kg | d1 | |
| 大腸がん | 大腸 | SIR+Bmab | アバステチン | 7.5 mg/kg | d1 | 3週 |
| | | | イリノテカン | 150 mg/m2 | d1 | |
| 大腸がん | 大腸 | | S1 | 80 mg/m2 | d1-14 | |

| | | | | | | |
|------|----|----------------|---------|------------------------|----|----|
| 大腸がん | 大腸 | sLV5FU2 + Bmab | アバスタチン | 5 mg/kg | d1 | 2週 |
| | | | レボホリナート | 200 mg/m ² | d1 | |
| | | | 5-FU | 400 mg/m ² | d1 | |
| | | | 5-FU | 2400 mg/m ² | d1 | |

| | | | | | | |
|---------|-----|--|----------|---------------|------------|----|
| 大腸がん | 大腸 | sLV5FU2 + Cmab | アービタックス | 250-400 mg/m2 | d1,8 | 2週 |
| | | | レボホリナート | 200 mg/m2 | d1 | |
| | | | 5-FU | 400 mg/m2 | d1 | |
| | | | 5-FU | 2400 mg/m2 | d1 | |
| 大腸がん | 大腸 | SOX | S1 | 80 mg/m2 | d1-14 | 3週 |
| | | | エルブラット | 130 mg/m2 | d1 | |
| 大腸がん | 大腸 | TAS102+Bmab | アバスチン | 5 mg/kg | d1,15 | 4週 |
| | | | ロンサーフ | 70 mg/m2 | d1-5, 8-12 | |
| 大腸がん | 大腸 | XELIRI+Bmab | カンプト | 200 mg/m2 | d1 | 3週 |
| | | | ゼローダ | 1600 mg/m2 | d1-14 | |
| | | | アバスチン | 7.5 mg/kg | d1 | |
| 大腸がん | 大腸 | XELOX | エルブラット | 130 mg/m2 | d1 | 3週 |
| | | | ゼローダ錠 | 2000 mg/m2 | d1-14 | |
| | | | アバスチン | 7.5 mg/kg | d1 | |
| 大腸がん | 大腸 | XELOX + Bmab | エルブラット | 130 mg/m2 | d1 | 3週 |
| | | | ゼローダ錠 | 2000 mg/m2 | d1-14 | |
| | | | アバスチン | 7.5 mg/kg | d1 | |
| 大腸がん | 大腸 | XELOX + Bmab (XB) | アバスチン | 7.5 mg/kg | d1 | 3週 |
| | | | ゼローダ錠 | 2000 mg/m2 | d1-14 | |
| | | | アバスチン | 7.5 mg/kg | d1 | |
| 大腸がん | 大腸 | (MSI-High CRC) Nivo+Ipi (1-4サイクル) | オブジーボ | 240 mg/body | d1 | 3週 |
| | | | ヤーボイ | 1 mg/kg | d1 | |
| 大腸がん | 大腸 | (MSI-High CRC) Nivo+Ipi (5サイクル以降維持療法) 【2w】 | オブジーボ | 240 mg/body | d1 | 2週 |
| 大腸がん | 大腸 | (MSI-High CRC) Nivo+Ipi (5サイクル以降維持療法) 【4w】 | オブジーボ | 480 mg/body | d1 | 4週 |
| 肝・胆・膵がん | 肝胆膵 | Atezo+Bmab 【3W】 | テセントリク | 1200 mg/body | d1 | 3週 |
| | | | アバスチン | 15 mg/kg | d1 | |
| 肝・胆・膵がん | 肝胆膵 | Dur+Tre 【4W】 (初回) | イミフィンジ | 1500 mg/body | d1 | 4週 |
| | | | イシュド | 300 mg/body | d1 | |
| 肝・胆・膵がん | 肝胆膵 | Dur+Tre 【4W】 (2回目以降) | イミフィンジ | 1500 mg/body | d1 | 4週 |
| | | | オブジーボ | 80 mg/body | d1 | |
| 肝・胆・膵がん | 肝胆膵 | (HCC)Nivo+Ipi (1-4コース) 【3W】 | ヤーボイ | 3 mg/kg | d1 | 3週 |
| | | | オブジーボ | 240 mg/body | d1 | |
| 肝・胆・膵がん | 肝胆膵 | (HCC)Nivo維持療法 【2w】 | オブジーボ | 240 mg/body | d1 | 2週 |
| 肝・胆・膵がん | 肝胆膵 | (HCC)Nivo維持療法 【2w】 | オブジーボ | 480 mg/body | d1 | 4週 |
| 肝・胆・膵がん | 肝胆膵 | RAM 【2w】 | サイラムザ | 8 mg/kg | d1 | 2週 |
| 肝・胆・膵がん | 肝胆膵 | FOLFIRINOX | レボホリナート | 200 mg/m2 | d1 | 2週 |
| | | | カンプト | 150 mg/m2 | d1 | |
| | | | オキサリプラチン | 85 mg/m2 | d1 | |
| | | | 5-FU | 400 mg/m2 | d1 | |
| | | | 5-FU | 22400 mg/m2 | d1 | |
| 肝・胆・膵がん | 肝胆膵 | GC | シスプラチン | 25 mg/m2 | d1,8 | 3週 |
| | | | ゲムシタピン | 1000 mg/m2 | d1,8 | |
| | | | イミフィンジ | 1500 mg/body | d1 | |
| 肝・胆・膵がん | 肝胆膵 | Dur+GC 【3W】 | シスプラチン | 25 mg/m2 | d1,8 | 3週 |
| | | | ゲムシタピン | 1000 mg/m2 | d1,8 | |
| 肝・胆・膵がん | 肝胆膵 | Dur+GCメンテナンス 【4W】 | イミフィンジ | 1500 mg/body | d1 | 4週 |
| 肝・胆・膵がん | 肝胆膵 | Pembro+GC 【3W】 | キイトルーダ | 200 mg/body | d1 | 3週 |
| | | | シスプラチン | 25 mg/m2 | d1,8 | |
| 肝・胆・膵がん | 肝胆膵 | Pembro+GCメンテナンス 【3w】 (9コース目以降) | ゲムシタピン | 1000 mg/m2 | d1,8 | 3週 |
| | | | キイトルーダ | 200 mg/body | d1 | |
| | | | ゲムシタピン | 1000 mg/m2 | d1,8,15 | |
| 肝・胆・膵がん | 肝胆膵 | GEM | ゲムシタピン | 1000 mg/m2 | day1,8 | 4週 |
| 肝・胆・膵がん | 肝胆膵 | GS | ゲムシタピン | 1000 mg/m2 | day1,8 | 3週 |
| | | | S1 | 60 mg/m2 | day1-14 | |
| 肝・胆・膵がん | 肝胆膵 | Nab-PTX + GEM | アブラキサン | 125 mg/m2 | d1,8,15 | 4週 |
| | | | ゲムシタピン | 1000 mg/m2 | d1,8,15 | |
| | | | オニバイド | 70 mg/m2 | d1 | |
| 肝・胆・膵がん | 肝胆膵 | Nal-IRI+5FU 【2W】 | レボホリナート | 200 mg/m2 | d1 | 2週 |
| | | | 5-FU | 2400 mg/m2 | d1 | |
| 肝・胆・膵がん | 肝胆膵 | TACE | エビルピシシ | 40 mg/body | d1 | 4週 |