


□急性期からのリハビリテーション介入

急性期からのリハビリテーション介入（初期介入）



➤ 指標の説明

この指標は、発症や手術後、直ちに早い段階からリハビリテーションを開始することで、患者様の機能回復を促進し、合併症や廃用症候群（長期間の安静による心身の機能低下）を防ぐための重要な取り組みを示しています。まずは患者さんの状態をしっかりと評価し、「どのような治療を、どう進めていくか」という計画を立てることが非常に重要です。患者様のリスクを正確に把握し、チームで目標や計画を立てて全員で共有することが、安全かつ効果的な回復につながります。

➤ 定義

この指標は、疾患別リハビリテーションの全単位数（がん患者リハビリテーションを除く）に対し、発症または手術後 14 日以内に算定されたリハビリテーションの単位数が占める割合を算出しています。以下の計算式で示します。

分子：発症または手術後 14 日以内に算定した疾患別リハビリテーションの単位数

分母：リハビリテーションを実施した疾患別リハビリテーションの全単位数


➤ 評価

初期加算算定割合は 2022 年度 53.3%、2023 年度 55.13%、2024 年度 55.29% と年々上昇しております。この数値の伸びは、リハビリテーション開始時における「初期評価」や「計画立案」が、現場にしっかりと定着してきていることを示しています。また、これは評価用シートの整備、リスク管理の徹底、カンファレンスの実施といった継続的な取り組みの成果であると考えられます。

今後は、電子カルテなどを活用し、評価結果をチーム内ですぐに共有して治療に活かせる仕組み（フィードバック体制）をさらに強化してまいります。

□急性期からのリハビリテーション介入

急性期からのリハビリテーション介入（早期介入）



➤ 指標の説明

この指標は、発症や手術後、できるだけ早い段階からリハビリテーションを開始することで、患者様の機能回復を促進し、合併症や廃用症候群（長期間の安静による心身の機能低下）を防ぐための重要な取り組みの継続を示しています。これは、急性期病院におけるリハビリテーションの提供体制の質や、医療スタッフ間の連携状況をも反映する指標であり、入院期間の短縮や在宅復帰率の向上にも寄与します。

➤ 定義

この指標は、疾患別リハビリテーションの全単位数（がん患者リハビリテーションを除く）に対し、発症または手術後 30 日以内に算定されたリハビリテーションの単位数が占める割合を算出しています。以下の計算式で示します。

分子：発症または手術後 30 日以内に算定した疾患別リハビリテーションの単位数

分母：リハビリテーションを実施した疾患別リハビリテーションの全単位数

➤ 評価

早期加算算定割合は、2022 年度 79.39%、2023 年度 79.38%、2024 年度 81.23%と、概ね安定して高い水準で推移しております。これは、リハビリスタッフが ICU や SCU 等でのカンファレンスへ毎日参加し、リスク管理を含めた介入方針を迅速かつ適切に決定できていること、また、多職種との連携体制が確立している成果と考えられます。

今後は、現在の良好な体制を基盤とし、さらに退院後の方向性（転院、自宅退院など）に関する情報連携を円滑にすることで、急性期リハビリテーションへの特化と専門性の深化を目指してまいります。