

## 褥瘡推定発生率

当院ご入院中に発生した患者さんの褥瘡（床ずれ）推定発生率です。

| 2023年4月 | 2023年5月 | 2023年6月 | 2023年7月 | 2023年8月 | 2023年9月 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0.3%    | 0.0%    | 0.0%    | 0.0%    | 0.0%    | 0.0%    |

| 2023年10月 | 2023年11月 | 2023年12月 | 2024年1月 | 2024年2月 | 2024年3月 |
|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 0.0%     | 0.0%     | 0.0%     | 0.0%    | 0.0%    | 0.0%    |

|                |
|----------------|
| ※全国一般病院<br>平均値 |
| 1.2%           |

定義

算出期間：2023年4月から2024年3月

(調査日に褥瘡を保有する患者数－入院時すでに褥瘡を保有していた患者数) / 調査日の当院入院患者数 × 100 (%)

注1 調査日の施設入院患者数：調査日に入院または入院予定者は含めない。

調査日に退院または退院予定者は含める。

注2 1名患者が褥瘡を複数部位有していても、患者数は1名として数える。

注3 入院時すでに褥瘡を保有していた患者であっても、新たに入院中に褥瘡が発生した場合は、院内褥瘡発生者として取り扱い、褥瘡推定発生率を算出する。

※表中の「全国一般病院平均値」は、

日本褥瘡学会 「第4回（平成28年度）日本褥瘡学会実態調査委員会報告1」より引用しています。